

No sirve aislar a los fumadores

Publicado el: 04-12-2017

Las organizaciones anti-tabaquismo acogieron de buen grado el estudio. Las áreas para no fumadores en los restaurantes y bares no logran protegerlos de los efectos dañinos del cigarrillo, sugiere un estudio científico. Un equipo de profesionales de la salud en Australia llevó a cabo una investigación en 17 locales, algunos con secciones para no fumadores y otros sin ellas.

Aunque los niveles de nicotina y otras sustancias químicas eran más bajos en los sectores donde no se fumaba, estos seguían siendo relativamente altos.

El estudio dado a conocer en la publicación especializada Control del Tabaquismo, dice que sólo son seguros los lugares donde impera la prohibición total de fumar.

Miles de personas están expuestas a los efectos del tabaco aunque no fumen.

Nuevas leyes

En el Reino Unido, por ejemplo, se calcula que se producen 1.000 muertes por año entre los fumadores pasivos.

Según los científicos australianos, las áreas donde el fumar está prohibido reducen el nivel de nicotina en un 50%.

Las organizaciones anti-tabaquismo recibieron el estudio con gran beneplácito.

"Las pruebas científicas son claras. Necesitamos leyes adecuadas que prevengan fumar en los lugares de trabajo y en los espacios públicos cerrados", afirmó Deborah Arnott, directora de la organización anti-tabaquismo ASH.

Mientras tanto, el gobierno británico se mostró renuente a implementar leyes que prohíban fumar en lugares públicos.

Irlanda se convertirá en el primer país de Europa en introducir tales reglas a partir de marzo.

Fuente: <https://netsaluti.com>